

La am gdala de los ni s, que desde el nacimiento tienen una madre con depresi n, era significativamente mayor que la de los ni s cuya madre no ten a s ntomas depresivos. Estos hallazgos son concordantes con los de otros estudios en los que se observ  que los ni s que sufren abusos o viven en orfanatos tambi n desarrollan una am gdala de mayor volumen. Estos ni s tienen adem s los niveles salivares de glucocorticoides aumentados, lo que significa una mayor reactividad ante el estr s.

Los autores, a partir de estos resultados, recalcan la importancia del tratamiento no solo de la persona que est  deprimida, sino tambi n de toda la unidad familiar para manejar el estr s asociado a la situaci n que viven.

El estudio se realiz  entre 38 ni s, de 10 a os, 17 de ellos tienen una madre que sufre depresi n y 21 tienen madres sin s ntomas de depresi n.

<http://www.medscape.com/viewarticle/748194?src=mpnews&spon=26>

*Lupien SJ, Parent S, Evans AC, Tremblay RE, Zelazo PD, Corbo V, Pruessner JC, S uvin. Larger amygdala but no change in hippocampal volume in 10-year-old children exposed to maternal depressive symptomatology since birth JR. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Aug 15. [Epub ahead of print]*