

El estudio dirigido por el Dr. Martínez-García, neumólogo del Hospital General de Requena, Valencia, y realizado con 939 pacientes ancianos concluye que: Los pacientes ancianos, al igual que otros más jóvenes, con un Síndrome de Apneas-Hipopneas (SAHS) grave y no tratado tienen un índice más alto de mortalidad cardiovascular que aquellos con SAHS leve a moderado o a aquellos que no padecen la enfermedad y, por otra parte, el tratamiento con CPAP puede reducir la mortalidad entre los pacientes ancianos que sufren un SAHS grave hasta los valores encontrados entre los ancianos sin enfermedad o con SAHS leve a moderado.

El tratamiento con CPAP ha resultado muy efectivo para las formas severas y las sintomáticas del SAHS, sin embargo hasta ahora todos los estudios se habían realizado en personas adultas de edad media. Este resultado resulta muy importante teniendo en cuenta el aumento progresivo de la longevidad en todo el mundo.

<http://esciencenews.com/articles/2011/05/15/cpap.decreases.cardiovascular.mortality.elderly.patients>

All-Cause And Cardiovascular Mortality In Elderly Patients With Sleep Apnea. Role Of CPAP Treatment. A 6-Year Follow-Up Study" (Session A19, Sunday, May 15, 8:15-10:45 a.m., Room 201-203 (Street Level), Colorado Convention Center; Abstract 20052)